

	福島県		県中地域				須賀川・岩瀬地区				石川地区				田村地区			
	15週	第14週	第15週		第14週		第15週		第14週		第15週		第14週		第15週		第14週	
	感染症動向	感染症動向	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報
インフルエンザ	290	279	20	23	22	0	13	14	19	0	0	6	8	0	7	3	2	0
咽頭結膜熱	15	25	1	3	6	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	4	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	153	115	31	0	15	0	14	0	8	0	0	0	0	0	17	0	7	0
感染性胃腸炎	234	174	119	0	41	2	119	0	25	0	0	0	0	2	0	0	0	0
水痘	15	10	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	16	13	0	26	0	0	0	20	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0
伝染性紅斑	39	29	3	0	4	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	34	43	5	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ヘルパンギーナ	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	6	4	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	23	19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	15	13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【感染症発生動向調査】 ※定点医療機関からの情報をもとに集計 【学校欠席者情報】 ※保育園、幼稚園、小中学校、高等学校の欠席者情報です。

## ツツガムシにご注意を！！

### 〇つつが虫病とは

- 病原微生物を保有するツツガムシ(ダニの一種)の幼虫に刺された後、1~2週間後に発症する感染症です。人から人には感染しません。
- 予防できるワクチンはありません。ツツガムシに刺されないように予防することが重要です。
- ツツガムシは非常に小さく肉眼ではほとんど見えません。刺されたときの痛みもほとんどないと言われています。
- つつが虫病の原因となる微生物を保有するツツガムシは0.1~1%程度と考えられています。ツツガムシに刺されたからと言って、必ずつつが虫病になるというわけではありません。
- 全国ではほぼ毎年、死亡例も報告されています。治療は適切な抗菌薬を投与することです。



## ツツガムシ病の症状・刺されないための予防対策

### 〇つつが虫の症状

- 主要3徴候：80%以上の方でみられる症状  
①発熱 ②発疹 ③刺し口
- その他の症状  
全身倦怠感、頭痛、リンパ節腫脹



### 〇ツツガムシに刺されないためには

- ツツガムシの主な生息地は田畑、山林、河川敷、草原です。
- 生息地に出かけるときは、サンダル、短パン等の肌が露出するような服装は避けましょう。
- 田畑や草むらに直接腰をおろしたり、脱いだジャンパーや服を置かないようにしましょう。
- 衣服等にツツガムシが入り込んでいる可能性もあるため、帰宅後はシャワーを浴びるなど体を洗い流し、



