

# だいち通信 第2号 (通算68号)

(令和7年6月発行)

会津若松市・磐梯町・猪苗代町・JA会津よつば(あいづ地区)  
福島県農業共済組合会津支所・JA全農福島県本部  
福島県会津農林事務所農業振興普及部

## 国産大豆の需要が高まっています!


### 東北地方 今後1ヶ月(5/31~6/30) 天候の見通し

○暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高くなるでしょう。  
○特に期間の後半は、気温が高くなる見込みです。  
○降水量は、ほぼ平年並の見込みです。

気温  20 30 50

降水量  30 30 40

日照時間  40 30 30

 低い(少ない) 平年並 高い(多い)

### ☑今回の栽培ポイント


- ①中耕培土 ②雑草対策(茎葉処理) ③湿害対策

## 1 中耕培土

基本的に2回、大豆の生育に応じて行いましょう。

### 中耕培土の効果

- ①培土部分からの不定根の発生を促進し、養水分の吸収が向上します。
- ②不定根に着生する根粒菌の窒素固定が期待できます。
- ③倒伏防止効果が期待できます。
- ④土壌の通気性が改善され、根粒菌や根の発育が良くなります。
- ⑤土壌をかくはんし、雑草の発生を抑えます。



### 1回目

時期：大豆3~4葉期  
高さ：子葉節が隠れる高さまで

### 2回目

時期：大豆5~6葉期  
高さ：初生葉が隠れる高さまで

最後の中耕・培土は開花期の10日前までには終わらせましょう。

!! 農作業中の熱中症に注意しましょう!!  
これから本格的な夏季を迎えます。  
作業前・作業中はこまめな水分補給や休憩をとりましょう。



## 2 除草対策

土壌処理剤→**茎葉処理剤**→中耕培土(2回)→大豆茎葉による畝間の遮へい

茎葉処理剤 ～雑草に合わせて散布しましょう～

### ナブ乳剤

ポルトフロアブル

- ・イネ科雑草



### 大豆バサグラン液剤 (ナトリウム塩)

- ・イヌタデ
- ・アメリカセンダングサ
- ・スベリヒユ



### アタックショット 乳剤

- ・ホソアオゲイトウ
- ・シロザ
- ・イヌホオズキ




後発雑草対策【大豆バサグラン液剤(ナトリウム塩)の散布ポイント】

雑草が育ってしまうと茎葉処理剤は効きにくくなります。  
雑草の大きさに注意し、散布が遅れないようにしましょう。

防除適期：大豆2～3葉期（播種後約20～30日後程度）

遅くとも..雑草6葉期までに散布しましょう。



**注目!**

出芽後でも散布できる除草剤があります！

降雨で土壌処理剤が散布できなかった…



大豆が小さくて茎葉処理剤が  
散布できない…

**パワーガイザー液剤**

使用時期

出芽直前～3葉期まで

効果のある雑草

- ・タデ科
- ・シロザ
- ・イネ科

## 3 湿害対策

大豆は湿害に弱い作物です

～湿害により葉の黄化がみられた場合～

硫安や尿素の追肥を行きましょう

10aあたり) 硫安：5～10kg 尿素：2～5kg