



# たむらの稲作情報 ー第2号ー


令和8年3月26日発行

JA福島さくらたむら統括センター・田村農業普及所

〈 問合せ先：0247-62-3113 〉

《1ヶ月予報 (3/19 仙台管区気象台発表、3/21～4/20)》

気温は「**平年より高い**」、降水量は「**平年並みまたは多い**」確率が高い



育苗中はハウス内を「**高温**」にしないよう注意！！

## 1 育苗期間中の温度管理

◇もみ枯細菌病や苗やけ等の予防のため、育苗期間中全体で、

28度以下の温度管理を徹底しましょう。

(高温が予想される場合、朝早めにハウスサイドを開けて換気をしましょう。)

◇霜注意報など低温(5度以下)が予想される際は、被覆シートなどで保温しましょう。

**～～育苗期間中の温度管理の目安～～**

- ①出芽時(無加温の場合) ⇒ 昼 28度以下
- ②緑化期(出芽揃い～緑化) ⇒ 昼 25度、夜 12～15度
- ③硬化期(緑化～移植前) ⇒ 昼 20度、夜 10～15度

緑化し、1葉以降は、ハウスサイドを開け、温度低めで管理しましょう！

## 2 育苗中の追肥

予定外に田植え日が遅れるなどして苗の葉色が淡くなった場合、窒素成分1g/箱程度の追肥を行いましょ。

(例) 育苗箱1箱あたり硫酸5gを水0.5リットルに溶いて、かん水

※肥料焼けの原因となるため、追肥後は、すぐに葉にかん水してください。

## 3 代かき

◇入水前に畦や水尻等をチェックし、しっかり畦塗り等の補修を行い、漏水がないようにしましょ。

◇代かきは、稲わらや発生した雑草を土壌に練り込むために、浅水で行いましょ。

## 4 田植えと施肥

◇土づくりや倒伏防止のため、堆肥や土壌改良資材を散布しましょ！

(例) 10a 当たり散布量⇒堆肥：1トン、ケイカル：100～150kg、ケイ酸カリ：40kg

※昨年倒伏した水田は基肥を減らしましょ。

◇4月中の極端な早植え、強風、低温時は避けて、移植しましょ。

◇品種や地域に適した適正な栽植密度を設定しましょ。

### 【栽植密度の目安】

ひとめぼれ・チヨニシキ：60株/坪

コシヒカリ：50～60株/坪

里山のつぶ・天のつぶ・ふくひびき(飼料用米)：60～70株/坪

※上記3品種は茎数が増えにくい特性のため、やや密植としましょ。



## 5 田植え後の水管理

- ◇活着後は日中3～4cmの浅水で止水し、日中の水温上昇を図り、有効茎の早期確保に努めましょう。
  - ◇田に入ると泡（ガス）が出る、臭いニオイがしてイネの生育が悪い場合には、3～4日間落水して、ガスを抜きましょう（稲わら等の分解により還元状態となっています）。
  - ◇藻類や表層剥離は、水温を下げてイネの生育が悪くなる、苗を押し倒すなどの害を与えます。藻類や表層剥離の発生が多い場合は、早めに一度落水して水を入れ替える等の対応をしましょう。
- 毎年、発生が多いほ場は、植代後、藻類・表層剥離に有効な初期除草剤を散布しましょう（例：クラールEW、先陣1キロ粒剤等）。

## 6 雑草及び病虫害防除

### (1) 雑草防除

- ◇雑草が多い水田は、初期剤＋初中期一発剤の体系処理としましょう。  
（体系処理の例）  
植代後：初期剤（ソルネット1キロ粒剤）⇒7日間止め水  
⇒移植7日後：初中期一発剤（ボデーガードプロ1キロ粒剤）  
※処理条件や散布時期等は薬剤のラベルを良く確認すること！
- ◇除草剤散布後7日間は止水管理とし落水やかけ流しは行いません。
- ◇除草剤は水田内で一番生育の早いノビエの葉令を見て、遅れずに散布しましょう。  
（ラベルに「ノビエ3.0葉まで」と記載がある場合、0.5葉早い「2.5葉まで」に使用すると効果が安定します。）

### (2) 病虫害防除

- ◇いもち病や初期害虫の対策として、田植え時に箱処理剤による防除を行います。（例）Dr.オリゼパディート粒剤、ブーンレパード箱粒剤
- ◇「斑点米カメムシ類」対策として、移植後はカメムシ類のえさとなる水田畦畔のイネ科雑草の定期的な草刈りや、水田内に雑草を残さないよう初中期除草を確実に行うようにしましょう。
- ◇水田での薬剤防除は、ドローンでの散布が効果的です。  
（JAでのドローン防除受託希望の方は、4月中に各アグリへ相談ください（申込期限：4月末まで、ほ場要件があります）



～農作業事故や熱中症に注意！～【春の農作業安全運動推進運動実施中(3/1～5/31)】

「たむらの稲作情報」は令和8年1号より、田村農業普及所 HP へ掲載します。

〈 普及所 HP アドレス <https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36221a/> 〉